

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dekskripsi hasil penelitian, dan pembahasan yang penulis sajikan sebelumnya, faktor yang paling berperan dalam kejadian stunting pada balita yaitu faktor, Panjang badan lahir pendek dan usia kehamilan prematuritas, di ikuti dengan lama pemberian ASI eksklusif <atau> 6 bulan, usia makan pertama <atau> 6 bulan. Lalu faktor yang tidak berpengaruh untuk kejadian stunting adalah skor MP-ASI, Berat badan lahir rendah.

#### 5.2 Saran

Ada beberapa saran yang perlu di sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, di antara lain:

##### 1. Bagi keluarga responden

Di harapkan bisa sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk para orang tua balita yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ilmu keperawatan anak dan kesehatan kandungan untuk para ibu hamil dan keluarga responden.

##### 2. Bagi institute sains RS. dr soepraoen

Informasi dari penelitian ini di harapkan bisa sebagai bahan pertimbangan untuk pembelajaran kesehatan masyarakat mengenai kasus khusus faktor risiko kejadian balita stunting

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel terkhusus untuk yang ingin mereview/membandingkan dengan menggunakan metode data sekunder atau meneliti faktor lain serta mempertimbangkan desain penelitian yang akan di gunakan sehingga dapat bersifat penyempurnaan terhadap penelitian ini.

