

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hampir seluruh responden mengalami kehilangan kemampuan penciuman (anosmia) akibat covid-19 sebanyak 24 orang atau 82.5%, adapun responden yang mengalami penurunan kemampuan penciuman sebanyak 8 orang atau 25% dan kemampuan penciuman yang paling banyak menurun adalah penciuman pada bau makanan sebanyak 4 orang atau 50%. Pada data kemunculan gejala gangguan penciuman, didapatkan rata-rata hari ke-2, anosmia mereda pada rata-rata hari ke-12, dan lama pasien covid mengalami anosmia rata-rata 9 hari (7 – 14 hari).

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bagi Responden

Harus segera melakukan isolasi bila muncul gejala gangguan penciuman yang disertai ataupun tidak disertai gejala fisik yang lain.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan guna pembelajaran mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah sub bab infeksi pernafasan akibat covid-19.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan gangguan penciuman dan covid-19

