

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tentang Pengaruh Kunyit Asam Terhadap Penyembuhan Luka *Perineum* pada Ibu *post partum* Di PMB Cucu Isma dan PMB Sri Wahyuni Kec. Karangploso Kabupaten Malang yang dilakukan pada bulan Maret – April 2023. Hasil penelitian dalam bab ini berupa data umum dan data khusus. Data umum meliputi usia, Pendidikan, pekerjaan. Sedangkan data khusus meliputi Pengaruh Kunyit Asam Terhadap Penyembuhan Luka *Perineum* pada Ibu Postpartum.

#### **4.1 Data Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PMB Cucu Isma yang berlokasi di Lasah Tawangagro RT.38 RW. 10 Kec. Karangploso Kabupaten Malang dan PMB Sri Wahyuni yang berlokasi di Perumahan Agro Griyatama Regency a-16 Kec. Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia. Lokasi ini yang cukup strategis dari segi demografi, karena bertempat di pinggir jalan raya sehingga menjadi daya tarik sendiri.

Pengolahan serta pemilik dari PMB tersebut adalah Ibu Bd. Cucu Isma, STr.Keb dengan nomer SIPB 503/201/SIPB.1/35.07.122/2022 dan di Ibu Sri Wahyuni,. S. ST. Keb dengan nomor SIPB 503.2/98.2/KAB/SIPB/IV/2021. PMB Cucu Isma memiliki 4 ruangan besar terdiri dari 1 ruang periksa, 1 ruang tunggu ,1 ruang persalinan yang di bagi dengan ruang sterilisasi dan cuci alat yang dilengkapi dengan standar yang berlaku, 1 ruang nifas yang dibagi 3 bagian yaitu terdapat 3 bed, 1 kamar mandi, dan baby spa. PMB Sri Wahyuni memiliki 3 ruangan besar yang terdiri dari 1 ruang bersalin yang di bagi menjadi ruang sterilisasi dan cuci alat yang di lengkapi dengan standar yang

berlaku, 1 ruang nifas, 1 ruang periksa yang di bagi menjadi ruang obat. Di PMB Cucu Isma dan PMB Sri Wahyuni melayani Persalinan, Pemeriksaan Kehamilan, KB, Nifas, Anak Sakit, Tindik, Konsultasi Kehamilan Dan KB, Imunisasi, Periksa Sakit.

## 4.2 Data Umum

### 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Hasil penelitian pada data umum didapatkan karakteristik usia responden di bagi menjadi <20 tahun, 21-35 tahun, >35 tahun dalam kelompok eksperimen dan kelompok control. Berikut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Kontrol		Intervensi	
	F	%	F	%
<20 tahun	2	12.5	1	6.3
20-35 tahun	11	68.8	12	75.0
>35 tahun	3	18.8	3	18.8
Total	16	100.0	16	100.0

(Sumber : Data Primer 2023)

Berdasarkan tabel 4.1 sejumlah 16 responden sebagai kelompok eksperimen yaitu di beri kunyit asam, didapatkan hasil Sebagian besar berusia 20-30 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase (75%). Sedangkan untuk 16 responden sebagai kelompok control yang tidak di berikan kunyit asam, didapatkan hasil Sebagian besar berusia 20-30 tahun sebanyak 11 orang dengan presentase (68,8%).

#### 4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu

Hasil penelitian pada data umum didapatkan karakteristik usia responden di bagi menjadi SD,SMP,SMA,DIPLOMA/Perguruan Tinggi dalam kelompok eksperimen dan kelompok control. Berikut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pedidikan Ibu**

Pendidikan	Kontrol		Eksperimen	
	F	%	F	%
SD	2	12.5	2	12.5
SMP	4	25.0	5	31.3
SMA	9	56.3	8	50.0
DIPLOMA/PT	1	6.3	1	6.3
Total	16	100.0	16	100.0

(Sumber : Data Primer 2023)

Berdasarkan tabel 4.2 sejumlah 16 responden sebagai kelompok eksperimen yaitu di beri kunyit asam, didapatkan hasil setengahnya berpendidikan SMA sebanyak 8 orang dengan presentase (50%). Sedangkan untuk 16 responden sebagai kelompok control yang tidak di berikan kunyit asam, didapatkan hasil Sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 9 orang dengan presentase (56,3%).

#### 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu

Hasil penelitian pada data umum didapatkan karakteristik pekerjaan responden di bagi menjadi IRT, swasta, wirausaha dan pegawai negeri dalam kelompok eksperimen dan kelompok control. Berikut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu**

Pekerjaan	Kontrol		Eksperimen	
	F	%	F	%
IRT	5	31.3	8	50.0
SWASTA	8	50.0	5	31.3
WIRASWASTA	3	18.8	2	12.5
PNS	0	0	1	6.3
Total	16	100.0	16	100.0

(Sumber : Data Primer 2023)

Berdasarkan tabel 4.3 sejumlah 16 responden sebagai kelompok eksperimen yaitu di beri kunyit asam, didapatkan hasil setengahnya menjadi IRT sebanyak 8 orang dengan presentase (50%). Sedangkan untuk 16 responden sebagai kelompok kontrol yang tidak di berikan kunyit asam, didapatkan hasil setengahnya menjadi wiraswasta sebanyak 8 orang dengan presentase (50%).

#### 4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas Ibu

Hasil penelitian pada data umum didapatkan karakteristik paritas responden di bagi menjadi primipara dan multipara dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berikut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas Ibu**

Paritas	Kontrol		Eksperimen	
	F	%	F	%
Primipara	9	56.3	7	43.8
Multipara	7	43.8	9	56.3
Total	16	100.0	16	100.0

(Sumber : Data Primer 2023)

Berdasarkan tabel 4.4 sejumlah 16 responden sebagai kelompok eksperimen yaitu di beri kunyit asam, didapatkan hasil Sebagian besar menjadi multipara sebanyak 9 orang dengan presentase (56,3%).

Sedangkan untuk 16 responden sebagai kelompok control yang tidak di berikan kunyit asam, didapatkan hasil sebagian besar menjadi primipara sebanyak 9 orang dengan presentase (56,3%).

### 4.3 Data Khusus

#### 4.3.1 Mengidentifikasi Penyembuhan Luka *Perineum* Pada Ibu *Post Partum*

##### Pada Kelompok Control

Hasil penelitian yang telah didapatkan dari skor REEDA berdasarkan penyembuhan luka *Perineum* pada ibu postpartum pada kelompok control. Berikut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 5 Mengidentifikasi Penyembuhan Luka *Perineum* Pada Ibu *Post Partum* Pada Kelompok Control**

Skala REEDA	Kontrol	
	F	%
0-2	3	18.8
3--5	8	50.0
6-8	4	25.0
9-15	1	6.3
Total	16	100.0

(Sumber : Data Primer 2023)

Berdasarkan tabel 4.5 sejumlah 16 responden sebagai kelompok control yang tidak diberikan kunyit asam didapatkan hasil setengahnya mendapatkan 3-5 skor REEDA sebanyak 8 orang dengan presentase (50%). Sedangkan sebagian kecil mendapatkan 6-8 skor REEDA sebanyak 4 orang dengan presentase (25%) , 0-2 skor REEDA sebanyak 3 orang dengan presentase (18,8%) dan 9-15 skor REEDA sebanyak 1 orang dengan presentase (6,3%).

#### 4.3.2 Mengidentifikasi Penyembuhan Luka *Perineum* Pada Ibu Pada Kelompok Eksperimen

Hasil penelitian yang telah didapatkan dari skor REEDA berdasarkan penyembuhan luka *Perineum* pada ibu postpartum pada kelompok eksperimen. Berikut dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 6 Mengidentifikasi Penyembuhan Luka *Perineum* Pada Ibu *Post Partum* Pada Kelompok Eksperimen**

Skala REEDA	Eksperimen	
	F	%
0-2	14	87.5
3-5	2	12.5
6-8	0	0
9-15	0	0
Total	16	100.0

(Sumber : Data Primer 2023)

Berdasarkan tabel 4.6 sejumlah 16 responden sebagai kelompok eksperimen yang diberikan kunyit asam didapatkan hasil hampir seluruhnya mendapatkan 0-2 skor REEDA sebanyak 14 orang dengan presentase (87,5%). Sedangkan sebagian kecil mendapatkan 3-5 skor REEDA sebanyak 2 orang dengan presentase (12,5%).



### 4.3.3 Mengidentifikasi Pengaruh Kunyit Asam Terhadap Penyembuhan

#### Luka *Perineum* Pada Ibu *Post Partum*

**Tabel 4. 7 Pengaruh Kunyit Asam Terhadap Penyembuhan Luka *Perineum* Pada Ibu *Post Partum***

	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor penyembuhan luka	Control	16	22.31	357.00
	Eksperimen	16	10.69	171.00
	Total	32		
Uji <i>Mann-Whitney</i>	P value . 0,000			

(Sumber : Data Primer 2023)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas didapatkan hasil Uji *Mann-Whitney* menunjukkan bahwa skor REEDA pada kelompok eksperimen lebih rendah yaitu 10,69 dibandingkan dengan kelompok control dengan hasil yaitu 22,31 yang artinya adalah rata-rata intensitas penyembuhan luka *Perineum* lebih rendah saat diberikan kunyit asam. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kunyit asam terhadap penyembuhan luka *Perineum* pada ibu *postpartum* di Cucu Isma dan Sri Wahyuni Kec. Karangploso Kabupaten Malang.