

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	BULAN																			
		NOV				DES				JAN				FEB				MAR			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Bimbingan dan pengerjaan proposal																				
2.	Ujian proposal																				
3.	Pengambilan data																				
4.	Bimbingan dan penyusunan KTI																				
5.	Ujian KTI																				

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian



**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
MUHAMMADIYAH MALANG**

TERAKREDITASI TINGKAT PERDANA *
Jl. KH. Wahid Hasyim 26, 30 Malang (65119)
Telp. (0341) 326222 (Hunting) Fax. (0341) 356480
Website : <http://rsi.amsmuhammadiyahmalang.com>
Email : rasim_mlg@yahoo.com

Nomor : 3573135/048/SKU/III.6.AU/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian
Kepada : Yth. Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan dr. Soepraoen
Di Malang

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas karunia dan rahmatNya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dalam menjalani kehidupan kita dijadikan orang orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan olehNya.

Sehubungan dengan Surat dari Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Instrtitut Teknologi, Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang Nomor : B/0030/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 Tentang Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini kami informasikan Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah BERSEDIA menerima permohonan sebagaimana yang termaksud pada pokok surat tersebut


Berkaitan dengan Biaya Magang, agar di konfirmasi ke bagian Keuangan RS Ibu dan Anak Muhammadiyah Malang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Malang, 02 Rajab 1443 H
03 Februari 2022 M

Direktur
RS Ibu dan Anak Muhammadiyah


dr. Ferida Rozany, MMRS
NBM. 1.332.693

Tembusan :

1. Ka. Bid. Keperawatan
2. Ka. Bid. SDI dan Diklat
3. Ka. Bid. Keuangan
4. Arsip



Surabaya - Gresik - Lamongan - Babat - Sumberejo - Bojonegoro - Tuban - Sidoarjo - Mojokerto -
Mojowarno - Jombang - Nganjuk - Kota Kediri - Kab. Kediri - Madiun - Ponorogo - Tulungagung -
Blitar - Malang - Kota Probolinggo - Rogojampi - Banyuwangi

TABEL PENGUMPULAN DATA


PX. NO.	JENIS KELAMIN	USIA	DIAGNOSA	OBAT	DOSIS	INDIKASI	RUTE PEMBERIAN	KONTRAINDIKASI	KETERANGAN
P1	P	3 TH BB : 15 KG	Obs.vomiting + dehidrasi ringan	1. Ceftriaxone 2. Ondansetron 3. Omeprazole 4. orezinc 5. Paracetamol inf	1. 2 x 600mg 2. 2 x 2mg 3. 1 x 2mg 4. 1 x 1 ml 5. 1 X 150mg	1. Antibiotik 2. Mencegah mual muntah pcs kemoterapi 3. Tukak dounenum,tukak lambung 4. Terapi untk diare anak 5. Analgesik	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. IV	1. hipersensitif ceftriaxone,neonatus hiperbilirubin 2. hipersensitiv ondansetron 3. - 4. - 5. gangguan hati	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P2	P	7 TH BB : 25 KG	DBD	1. Paracetamol inf 2. Antrain 3. Domperidone syr 4. Ranivel syr	1. 1 X 200mg 2. 1 X 200mg 3. 3 x 1 cth 4. 3 x 1 cth	1. Analgesik 2. Analgesik 3. Mual muntah akut 4. Tukak lambung	1. IV 2. IV 3. Oral 4. Oral	1. gangguan hati 2. hipersensitiv metampiron 3. - 4. -	- Antrain off-label usia untuk px diatas usia 16 tahun. (ISO 2019)
P3	L	2 TH BB : 11 KG	OF hari ke 8	1. Ceftriaxone 2. Paracetamol inf	1. 2 x 300mg 2. 1 X 100mg	1. Antibiotik 2. Analgesik	1. IV 2. IV	1. hipersensitif ceftriaxone,neonatus hiperbilirubin 2. gangguan hati	
P4	L	1 TH BB : 10 KG	GEA	1. Cefotaxim 2. Ondansetron 3. Omeprazole 4. Lacto B 5. Antrain	1. 3 X 150mg 2. 2 x 1mg 3. 1 x 10mg 4. 1 x 1 sac 5. 3 x 150mg	1. Antibiotik 2. Mencegah mual muntah pcs 3. Tukak dounenum,tukak lambung 4. probiotk 5. Analgesik	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. IV	1. - 2. hipersensitiv ondansetron 3. - 4. - 5. - 6. hipersensitiv	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)

								iv metampiron	
P5	L	3 BLN BB : 6,5 KG	GEA + Dehidrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lacto B 2. Nixaven syr 3. Ceftriaxone 4. orezinc 5. Ondansetron 6. Paracetamol inf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 X 1 SCH 2. 2 X 0,3ML 3. 2 x 300mg 4. 1 x 10mg 5. 1 x 1 sch 6. 1 X 1 mg 7. 1 X 60mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. probiotk 2. antibiotik 3. antibiotik 4. terapi untuk diare anak 5. mual muntah 6. analgesic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. oral 2. oral 3. IV 4. Oral 5. IV 6. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. – 3. hipersensitif ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 4. – 5. hipersensitiv ondansetron 6. 	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P6	L	1 TH BB : 10 KG	GEA + Vomiting + Dehidrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nixaver syr 2. Lacto B 3. Ceftriaxone 4. Ondansetron 5. Omeprazole 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 2,5 cth 2. 2 x 1 h 3. 2 x 500mg 4. 2 x 1mg 5. 1 x 10mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotik 2. Probiotik 3. Antibiotic 4. Mual muntah 5. Tukak lambung dan duodenum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oral 2. Oral 3. IV 4. IV 5. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. – 3. hipersensitif ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 4. hipersensitiv ondansetron 5. 6. - 	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P7	P	9 BLN BB : 7 KG	Hiperpireksia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orezinc 2. Lacto B 3. Kandistatin 4. Nixaver syr 5. Ceftriaxone 6. Sagestam 7. Omeprazole 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 x1 sch 2. 2 x 1 sch 3. 1 x 1 ml 4. 2 x 1,5ml 5. 2 x 300mg 6. 1 x 50mg 7. 1 x 10mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terapi untuk diare anak 2. Probiotik 3. Antibiotik 4. Antibiotic 5. Antibiotic 6. Antibiotic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oral 2. Oral 3. – 4. Oral 5. IV 6. IV 1. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. – 3. Hipersensitiv iv nystatin 4. – 5. hipersensitif 	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)

				8. Ondansetron 9. Paracetamol inf 10. Dexamethason	8. 2 x 1mg 9. 4 x 100mg 10. 3 x 2mg	7. Tukak lambung dan duodenm 8. Mual muntah 9. Analgesic 10. Asma bronkial	2. IV 3. IV 4. IV	ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 6. hipersensitiv gentamisin dan aminoglikosida 7. - 8. hipersensitiv ondansetron 9. 10. Hipersensitiv dexamethasone	
P8	L	1 THN BB : 10 KG	Obs. Vomitus + dehidrasi + ISPA	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Paracetamol inf 5. Nixaver syr 6. Sequest	1. 2 x 500mg 2. 1 x 10mg 3. 2 x 1mg 4. 1 X 100mg 5. 1 X 1,4mg 6. -	1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Mual muntah 4. Analgesic 5. Antibiotic 6. Menurunkan kadar bilirubin	1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. Oral 6. Oral	1. hipersensitif ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. hipersensitiv ondansetron 4. 5. - 6. - 7. -	- Sequest off-label usia .untuk px.diatas 16 tahun tetapi pada kasus resep digunakan untuk px. Dibawah 16 tahun. (BPOM,2020)
P9	L	4 TH BB : 20 KG	OF hari ke 2 + low intake	1. sanpicillin 2. Paracetamol inf 3. Lacto B	1. 3 x 700mg 2. 1 X 250mg 3. 2 x 1 sch 4. 1 X 20mg	1. Antibiotic 2. Analgesic 3. Probiotik	1. IV 2. IV 3. Oral	1. Hipersensitiv amoksilin,p enisilin	

					5. 3 x 250mg			2. - 3. -	
P10	L	9 BLN BB : 7,5 KG	BP + Leukositosis + hernia umbilicus +icteric	1. Cefixim 2. Cefotaxim 3. Paracetamol inf	1. 1 X 20mg 2. 3 x 250mg 3. -	1. antibiotik 2. antibiotik 3. analgesic	1. IV 2. IV 3. IV	1. Hipersensit iv sefiksim 2. - 3. -	.
P11	P	9 BLN BB : 7,5 KG	GEA + Dehidrasi berat	1. Nixaver syr 2. Lacto B 3. Ceftriaxone 4. Omeprazole 5. Ondansetron 6. Paracetamol inf 7. Orezinc	1. 2 x 2,5 cth 2. 1 x 1 sch 3. 2 x 500 mg 4. 1 x 10mg 5. 2 x 1 mg 6. 1 X 100mg 7. 1 x 20mg	1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Antibiotic 4. Tukak lambung dan duodenum 5. Mual muntah 6. Analgesic 7. Terapi untuk diare anak	1. Oral 2. Oral 3. IV 4. IV 5. IV 6. IV 7. oral	1. - 2. - 3. hipersensit if ceftriaxone ,neonatus hiperbiliru bin 4. - 5. hipersensit iv ondansetro n 6. 7. - 8. -	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P16	L	10 BLN BB : 8 KG	Susp. Bronco pneumonia	1. Paracetamol inf 2. Ventolin inh 3. Cefotaxim 4. Cefadroxil inj	1. 2 x 2,5mg 2. 2 x 500mg 3. 1 x 10mg 4. 2 x 1mg	1. Analgesic 2. Meredakan asma ringan 3. Antibiotic 4. Antibiotic	1. IV 2. Inhalasi 3. IV 4. IV		
P13	P	1 TH Bb : 9,8 KG	Bronchial pneumonia	1. Sanpicillin 2. Gentamicyn 3. Ambroxol 4. Paracetamol inf	1. 3 x 350mg 2. 1 x 50m 3. 1 X 5mg 4. 1 x 150mg	1. Antibiotic 2. - 3. Penyakit saluran napas akut 4. analgesik	1. IV 2. IV 3. Oral 4. IV	1. Hipersensit iv amoksilin,p enisilin 2. hipersensit iv gentamisin dan	

								aminoglikosida 3. - 4. -	
P14	L	1 TH BB : 10 KG	OF Fibris + susp. Viral infection	1. Cefotaxim 2. Paracetamol inf	1. 3 x 350mg 2. 1 X 100mg	1. Antibiotik 2. Analgesic	1. IV 2. IV		.
P15	P	7 TH BB : 25 KG	OF + abdominal pain	1. Amoxan drop 2. Sanpicillin 3. Ranitidin 4. Disfatyl 5. Lacto b 6. Paracetamol inf	1. 1 X 250 g 2. 3 x 750mg 3. 2 x 25mg 4. 3 x ½ tab 5. 2 x 1 sch 6. 1 X 200mg	1. Antibiotic 2. Antibiotic 3. Tukak lambung dan duodenum 4. kembung 5. Probiotik 6. Analgesic	1. Oral 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. IV	1. - 2. Hipersensitiv amoksilin, penisilin 3. - 4. - 5. - 6. -	
P16	P	2 TH BB : 11 KG	Thypoid fever	1. Ceftriaxone 2. Gentamicyn 3. Paracetamol inf	1. 1 x 500mg 2. 2 x 30mg 3. 1 X 165mg	1. Antibiotic 2. antibiotik 3. analgesic	1. IV 2. IV 3. IV	1. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. hipersensitiv gentamisin dan aminoglikosida 3. -	
P17	L	3 TH BB : 15 KG	Obs. Konvulsi + epilepsy	1. Sanmol syr 2. Asam valporat	1. - 2. 2 x 2,5 ml	1. Analgesic 2. Epilepsi	1. Oral 2. Oral		



P18	L	4 TH BB : 20,8 KG	DHF	1. Paracetamol inf 2. Zamel syr	1. 1 X 200mg 2. 1 x 1 cth	1. Analgesic 2. Vitamin dan mineral	1. IV 2. Oral		.
P19	P	4 BLN BB : 7 KG	Dyspenia	1. Cefotaxim 2. Ventolin inh	1. 3 x 250mg 2. 1 X 2 ml	1. Antibiotic 2. Meredakan asma ringan	1. IV 2. Inhalasi		
P20	P	10 TH BB : 7 KG	OF hari ke 3 + dyspenia + trombositopenia	1. Paracetamol inf 2. Lacto b 3. Domperidone 4. Antrain	1. 1 X 500 mg 2. 2 x1 sch 3. 3 x 1 4. 1 X 500mg	1. Analgesic 2. Probiotik 3. Dispesia,mual muntah 4. analgesik	1. IV 2. Oral 3. Oral 4. IV	1. - 2. - 3. - 4. hipersensitiv metampiron	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P21	P	10 TH BB : 7 KG	Of hari ke 3 +dyspepsia + trombositopenia	1. Paracetamol inf 2. Lacto b 3. Domperidone 4. Antrain	1. 1 X 500 mg 2. 2 x 1 sch 3. 3 x 1 mg 4. 1 X 500mg	1. Analgesic 2. Probiotik 3. Dispesia,mual muntah 4. Analgesic	1. IV 2. Oral 3. Oral 4. IV	1. - 2. - 3. - 4. hipersensitiv metampiron	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P22	L	11 BLN BB : 9 KG	BP +obs. Vomiting + dehidrasi ringan – sedang	1. Ceftriaxone 2. Ondansetron 3. Omeprazole 4. Lacto b 5. Puyer batuk 6. Ventolin inh 7. Combivent 8. Nixaven syr 9. Ambroxol 10. Salbutamol 11. Trimenza	1. 2 x 500mg 2. 2 x 1mg 3. 1 x 10mg 4. 1 x 75mg 5. 3 x 1 sch 6. 3 x 1 sch 7. 2,5/3 jam 8. 1,3/3jam 9. 2 x 2,5 cth 10. 3 x 10mg 11. 3 x 0,5mg 12. 3 x 1,4tab	1. Antibiotic 2. Mual untah 3. Tukak lambung dan duodenum 4. Probiotik 5. Batuk 6. Meredakan asma ringan 7. Obstruktif pulmonary distase 8. Antibiotic 9. Sekretolitik 10. Kejang bronkus 11. Antihistamin	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. Inhalasi 7. Inhalasi 8. Oral 9. Oral 10. Inhalasi 11. oral	1. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. hipersensitiv ondansetron 3. 4. - 5. - 6. - 7. - 8. -	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019) - Combivent off-label usia untuk px diatas usia 2 tahun. (ISO 2019) - Salbutamol off-label usia untuk anak diatas 2 tahun. - Trimenza off-label

								9. - 10. - 11. - 12. -	usia untuk px. Usia 6 tahun keatas.
P23	P	7 BLN BB : 7,3 KG	Obs. Konvulsi	1. Sanpicillin 2. Sibital 3. Antrain 4. Lacto b 5. Pamol	1. 2 x 250mg 2. 1 X 100mg 3. 1 X 80mg 4. 2 x 1 sch 5. 1 X 80mg	1. Antibiotic 2. Epilepsi 3. Analgesic 4. analgesik	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. IV	1. Hipersensit iv amoksilin,p enisilin 2. - 3. hipersensit iv metampiro n 4. - 5. -	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P24	L	7 BLN BB : 8 KG	GEA + Dehidrasi ringan – sedang	1. Ceftriaxone 2. Ondansetron 3. Omeprazole 4. Lacto b 5. Orezinc 6. Oralit	1. 2 x 400mg 2. 2 x 1 mg 3. 1 x 10mg 4. 2 x 1 sch 5. 1 x 20mg 6. 1 X 100 cc/sch	1. Antibiotic 2. Mual muntah 3. Tukak lambung dan duodenum 4. Probiotik 5. Terapi untuk diare anak 6. Penambah elektrolit	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. Oral	1. hipersensit if ceftriaxone ,neonatus hiperbiliru bin 2. hipersensit iv ondansetr on 3. 4. - 5. - 6. - 7. -	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah GEA (ISO 2019)
P25	P (alergi telur)	4 TH BB : 16 KG	Vomiting + dehidrasi ringan	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Intrizine 5. Orezinc 6. Nixaven syr	1. 2 x 600mg 2. 1 x 20mg 3. 2 x 2 mg 4. 1 x1 5. 1 x 1 sch 6. 2 x 2,5 ml	1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenm 3. Mual muntah 4. Alerg konjungtivitas 5. Terapi ntk diare anak 6. antibiotik	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. oral	1. hipersensit if ceftriaxone ,neonatus hiperbiliru bin 2. - 3. hipersensit iv	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)

								ondansetr on	
								4. 5. - 6. - 7. -	
P26	L	3 BLN BB : 6,5 KG	OF hari ke 14 + BP	1. Cefotaxim 2. Paracetamol inf 3. Cefixim	1. 3 x 250mg 2. 1 X 70mg 3. 2 x 20mg	1. Antibiotic 2. Analgesic 3. Antibiotic	1. IV 2. IV 3. IV	1. - 2. - 3. Hipersensit iv sefiksिम	
P27	L	8 TH BB : 20 KG	OBS. Vomiting	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Nixaven syr 5. Sukralfat syr	1. 2 x 1 g 2. 1 x 40mg 3. 2 x 4mg 4. 2 x 1 cth 5. 3 x 2,5 mg	1. Antibiotic 2. Tkak labung dan duodenum 3. Mual muntah 4. Antibiotic 5. Duodenal ulcer	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral	1. hipersensit if ceftriaxone ,neonatus hiperbiliru bin 2. - 3. hipersensit iv ondansetr on 4. 5. - 6. -	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019) - Sukralfat off-label usia untk px. Usia 16 than ke atas. (ISO 2019)
P28	P	10 TH BB : 25 KG	GEA + dehidrasi	1. Ondansetron 2. Domperidone 3. Lacto b	1. - 2. 3 x 0,4 mg 3. 2 x 1 sch	1. Mual muntah 2. Dispesia,mual muntah 3. probiotik	1. IV 2. Oral 3. Oral	1. hipersensit iv ondansetr on 2. - 3. -	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah GEA (ISO 2019)
P29	L	11 TH BB : 28,5 KG	Susp. pneмония	1. Methylpredni solon 2. Ventuln inh 3. Paracetamol inf	1. 1 x 15mg 2. 1/8 jam 3. 1 X 300 mg	1. - 2. Meredakan asma ringan 3. analgesik	1. IV 2. Inhalasi 3. IV		- Methylprednisolon off-label usia untuk px. Usia 16 than keatas. 9 ISO 2019)


P30	L	11 BLN BB : 9 KG	Kejang demam + ISPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cefotaxim 2. Gentamicin 3. Paracetamol inf 4. Antrain 5. Lacto b 6. Amoxicillin syr 7. Zamel drop 8. Sanmol 9. Diazepam 10. Dumin sup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 x 300mg 2. 2 x 30mg 3. 1 X 100mg 4. 1 X 100mg 5. 2 x 1 sch 6. 3 x 1 cth 7. 1 x 0,5ml 8. 0,9 ml/seperlunya 9. - 10. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. - 3. Analgesic 4. Analgesic 5. Probiotik 6. Antibiotic 7. Vitamin dan mineral 8. Analgesic 9. Kejang otot 10. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. Oral 6. Oral 7. Oral 8. Oral 9. Oral 10. Oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. hipersensitivitas gentamisin dan aminoglikosida 3. - 4. hipersensitivitas metampiron 5. - 6. Hipersensitivitas amoksisilin, penisilin 7. - 8. - 9. - 10. - 	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas. (ISO 2019)
P31	L	2 TH BB : 10,8 KG	OF hari ke2 + ISPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamol 2. antrain 3. zamel syr 4. epixol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 X 100mg 2. 1 X 100mg 3. 1 x 1 cth 4. 3 x 1,5 tab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analgesic 2. Analgesic 3. Vitamin dan mineral 4. Saluran napas akut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. Oral 4. Oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. hipersensitivitas metampiron 3. - 4. - 	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas. (ISO 2019)
P32	L	11 BLN BB : 11 KG	Obs. Konvulsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sabital 2. Ceftriaxone 3. Fenitoin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 25mg 2. 1 x 700mg 3. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Epilepsi 2. Antibiotic 3. Antikonvulsan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. hipersensitivitas if ceftriaxone, neonatus hiperbilirubin 3. - 	

P33	P (alergi pisang,telor,ayam)	7 BLN BB : 8,5 KG	GEA +dehidrasi + ISPA	1. Cefotaxim 2. Lacto b 3. Paracetamol inf 4. Cefixim	1. 3 x300mg 2. 2 x 1 sch 3. 1 X 100mg 4. 2 x 1 mg	1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Analgesic 4. Antibiotic	1. IV 2. Oral 3. IV 4. IV	1. – 2. – 3. – 4. Hipersensitiv iv sefiksim	.
P34	L (alergi ayam,telor,ikan,tempe)	9 TH BB : 31 KG	Abdominal pain	1. Methylprednisolon 2. Ranitidine 3. Antrain	1. 2 x 20mg 2. 3 x 30mg 3. -	1. – 2. Tkak lambung dan duodenum 3. Analgesic	1. IV 2. IV 3. IV	1. – 2. – 3. hipersensitiv iv metampiron	- Methylprednisolon off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas. 9 ISO 2019) - Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P35	L	1 TH BB : 9 KG	Hiperpireksia + GEA + dehidrasi	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Paracetamol inf 5. Antrain 6. Sanmol syr 7. Probiokid 8. Oralit 9. Orezinc	1. 2 x 500mg 2. 1 x10 mg 3. 2 x 1 mg 4. 4 x 100mg 5. 1 X 100mg 6. 2 x 2,5 ml 7. 1 x 1 sch 8. 1 sch/diare 9. 1 x 1 cth	1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Mual muntah 4. Analgesic 5. Analgesic 6. Analgesic 7. Antioksidan 8. Penambah elektrolit 9. Terapi untuk diare anak	1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. IV 6. Oral 7. Oral 8. Oral 9. oral	1. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. 3. hipersensitiv iv ondansetron 4. 5. – 6. – 7. hipersensitiv iv metampiron 8. – 9. – 10. – 11. -	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019) - Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)



P36	L	1 BLN BB : 4,7 KG	OF + jaundice	<ol style="list-style-type: none"> Sanpicillin Methylprednison Puyer uradex Domperodon e drop Paracetamol inf Zamel drop 	<ol style="list-style-type: none"> 3 X 150mg 2 x 4 mg 2 x 35mg 0,2 ml/muntah 1 X 50mg 1 x 0,5 ml 	<ol style="list-style-type: none"> Antibiotic - Batuk Dispesia,mual untah Analgesic Vitamin dan mineral 	<ol style="list-style-type: none"> IV IV Oral Oral IV Oral 	<ol style="list-style-type: none"> Hipersensitiv amoksilin,p enisilin - - - - - 	- Methylprednisolon off-label usia untuk px. Usia 16 than keatas. 9 ISO 2019)
P37	P	1 BLN BB : 4 KG	bronkopneumonia	<ol style="list-style-type: none"> Sanpicilin Gentamicin Ventolin inh Erysanbe 	<ol style="list-style-type: none"> 3 x 150 mg 1 x 20mg 1,5 / 4-6 jam 50mg 	<ol style="list-style-type: none"> Antibiotic - Meredakan asma ringan - 	<ol style="list-style-type: none"> IV IV Inhalasi Oral 	<ol style="list-style-type: none"> Hipersensitiv amoksilin,p enisilin hipersensitiv gentamisin dan aminoglikosida - - 	.
P38	P	7 BLN BB : 6 KG	GEA + dehidrasi berat	<ol style="list-style-type: none"> Lacto b Paracetamol inf 	<ol style="list-style-type: none"> 2 x 1 sch 1 X 70 mg 	<ol style="list-style-type: none"> Probiotik analgesik 	<ol style="list-style-type: none"> Oral IV 		
P39	L	10 BLN BB : 10,5 KG	Obs. Fibris + dehidrasi + obs. Vomitus	<ol style="list-style-type: none"> Gentamicin Cefotaxim Paracetamol inf Domperidone syr Antrain 	<ol style="list-style-type: none"> 2 x 25mg 3 x 300mg 1 X 165mg 1 x 3 ml - 	<ol style="list-style-type: none"> - Antibiotic Analgesic Dispesia,mual muntah Analgesic 	<ol style="list-style-type: none"> IV IV IV Oral IV 	<ol style="list-style-type: none"> hipersensitiv gentamisin dan aminoglikosida - - - hipersensitiv metampiron 	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)

P40	L	7 BLN BB : 6,2 KG	GEA +dehidrasi	1. Cefotaxim 2. Lacto b 3. Paracetamol inf	1. 3 x 200mg 2. 1 x 1 sch 3. 1 X 70mg	1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Analgesic	1. IV 2. Oral 3. IV		
P41	P	1,5 TH BB : 7,3 KG	GEA + obs.convulsi	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Sibital 5. Paracetamol inf 6. Diazepam 7. Antrain 8. Lacto b 9. Zamel 10. Vit A 11. Nacoflar 12. Orezinc	1. 2 x 400mg 2. 1 x 10mg 3. 3 x 1mg 4. 2 15mg 5. 4 x 100mg 6. 1 X 2mg 7. - 8. 2 x1 sch 9. 1 x 2,5 cth 10. 1 x 1 11. 3 x1 12. 2 x 1 cth	1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Mual muntah 4. Epilepsi 5. Analgesic 6. Kejang otot 7. Analgesic 8. Probiotik 9. Vitamin dan mineral 10. Vitamin 11. Antiinflamasi	1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. IV 6. Oral 7. Oral 8. Oral 9. Oral 10. Oral 11. Oral 12. Oral	1. hipersensi tif ceftriaxon e,neonatu s hiperbiliru bin 2. 3. hipersensi tiv ondansetr on 4. 5. - 6. - 7. - 8. - 9. hipersensi tiv metampir on 10. - 11. - 12. - 13. - 14. -	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019) - Diazepam off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019) - Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019) - Nacoflar off-label usia untuk px.usia diatas 1 tahun. (ISO 2019)
P42	L (alergi telur)	8 BLN BB : 7 KG	GEA + dehidrasi	1. Paracetamol inf 2. Lacto b 3. Sequest 4. Oralit	1. 1 X 80mg 2. 2 x1 sch 3. 3 x 1 4. -	1. Analgesic 2. Probiotik 3. Menurunkan kadar bilirubin 4. Penambah elektrolit	1. IV 2. Oral 3. Ora 4. Oral		- Sequest off-label usia .untuk px.diatas 16 tahun tetapi pada kasus resep digunakan untuk px. Dibawah 16 tahun. (BPOM,2020)



P43	P	4 TH BB : 16,5 KG	Asthma attack	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cefotaxim 2. Methylprednisolon 3. Paracetamol inf 4. Farrbivent 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 x 400mg 2. 2 x 10mg 3. 1 X 150mg 4. 1 X 25ml 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. antiinflamasi 3. Analgesic 4. Terapi bronkopasme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. Inhalasi 		- Methylprednisolon off-label usia untuk px. Usia 16 than keatas. 9 ISO 2019)
P44	P	7 BLN BB : 8,5 KG	GEA +dehidrasi + ISPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cefotaxim 2. Lacto b 3. Paracetamol inf 4. Cefixim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 x 300mg 2. 2 x 1 sch 3. 1 X 100mg 4. 2 x 1 mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Analgesic 4. Antibiotic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. Oral 3. IV 4. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. - 3. - 4. Hipersensitiv sefiksiv 	
P45	P	8 BLN BB : 7,6 KG	KDK + RFA + vomity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceftriaxone 2. Lacto b 3. Orezinc 4. Paracetamol inf 5. Dumin 6. Antrain 7. Nixaven syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 400mg 2. 2 x 1 sch 3. 1 x 20mg 4. 1 X 180mg 5. 1 X 165mg 6. 1 X 80mg 7. 2 x 2,5 cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Terapi untuk diare anak 4. Analgesic 5. - 6. Analgesic 7. Antibiotic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. Oral 3. Oral 4. IV 5. IV 6. IV 7. Oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. hipersensitiv iv metampiron 8. - 	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P46	P	1 BLN BB : 4 KG	GEA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamel drop 2. Ampicillin sulbactam 3. Gentamicin 4. Nixaven syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 x 1 ml 2. 2 x 200mg 3. 1 x 2 ml 4. 1 x 2,5 cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vitamin dan mineral 2. Antibiotic 3. antibiotik 4. Antibiotic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oral 2. IV 3. IV 4. oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. Hipersensitiv iv amoksilin,p enisilin 3. Hipersensitiv if gentamisin 4. - 	.

P47	P	1 TH BB : 8,5 KG	OF hari ke 3	1. Zamel syr 2. Paracetamol inf	1. 1 x 2,5 cth 2. 1 X 100mg	1. Vitamin dan mineral 2. Analgesic	1. Oral 2. IV		
P48	P	3 TH BB : 13 KG	Febris + diare	1. Nixaver syr 2. Lacto b 3. zamel syr 4. Ceftriaxone 5. Sequest 6. Orezinc syr 7. Pamol inf 8. Ondansetron 9. Omeprazole	1. 2 x 3,5ml 2. 3 x 1 sch 3. 1 x 1 cth 4. 2 x 650mg 5. 1,3 sch 6. 1 x 1cth 7. - 8. - 9. 1 x 15mg	1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Vitamin dan mineral 4. Antbiotk 5. Menurunkan kadar bilirubin 6. Terapi untuk diare anak 7. Analgesic 8. Mual untah 9. Tukak lambung dan duodenum	1. Oral 2. Oral 3. Oral 4. IV 5. Oral 6. Oral 7. IV 8. IV 9. IV	1. - 2. - 3. - 4. hipersensitif ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 5. - 6. - 7. - 8. hipersensitiv iv ondansetron 9. -	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019) Sequest off-label usia .untuk px.diatas 16 tahun tetapi pada kasus resep digunakan untuk px. Dibawah 16 tahun. (BPOM,2020)
P49	P	2,5 TH BB : 10,8 KG	OBS. Vomiting + dehidrasi ringan – sedang	1. Domperidone syr 2. Cefotaxim 3. Lacto b 4. Paracetamol inf	1. 3 x 1 cth 2. 1 X 400mg 3. 2 x 1 sch 4. -	1. Dispesia,mual muntah 2. Antibiotic 3. Probiotik 4. Analgesic	1. Oral 2. Oral 3. Oral 4. IV		
P50	L	1 TH BB : 10 KG	Bronkopneumoni	1. Nixaven syr 2. farbivent 3. ventolin inh 4. ampicillin 5. gentamicin	1. 2 x 2,5 ml 2. - 3. - 4. - 5. -	1. Antibiotic 2. Terapi bronkopasme 3. Meredakan asma ringan 4. Antibotik 5. Antibiotic	1. Oral 2. inhalasi 3. Inhalasi 4. IV 5. IV	1. - 2. - 3. - 4. Hipersensitiv iv amoksilin,p enisilin 5. hipersensitiv iv gentamisin dan aminogliko	- Farbivent off-label usia untuk px. Diatas 16 than. (ISO 2019)

								sida	
P51	L	1 TH BB : 16 KG	OF hari ke 4	1. Cefotaxim 2. Paracetamol inf 3. Antrain 4. Cefixim syr	1. 3 x 400mg 2. 1 X 165mg 3. 1 X 165mg 4. 2 x 2ml	1. Antibiotic 2. Analgesic 3. Analgesic 4. Antibiotic	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. Oral 7. IV	1. - 2. - 3. hipersensitiv metampiron 4. -	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P52	L	8 BLN BB : 7,3 KG	OF febris + susp. Viral infection	1. Zamel drop 2. Orezinc 3. Paracetamol inf	1. 1 x 0,5ml 2. 1 x 2,5ml 3. 1 X 80mg	1. Vitamin dan mineral 2. Terapi untuk diare anak 3. Analgesik	1. Oral 2. Oral 3. IV		
P53	P	9 BLN BB : 8 KG	Diare + dehidrasi	1. Ceftriaxone 2. Lacto b 3. Orezinc 4. Nixaven syr	1. 2 x 350mg 2. 2 x 1 sch 3. 1 x 1 cth 4. 4 x 100mg 5. 2 x 2ml	1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Terapi untuk diare anak 4. Antibiotic	1. IV 2. Oral 3. Oral 4. Oral	1. hipersensitiv ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. - 4. -	
P54	P	8 BLN BB : 7 KG	Hiperalergic	1. Azitromisin 2. Sanpicilin 3. Lasix 4. Ventolin inh 5. Gentamicin	1. 1 x 1 2. 3 x 250mg 3. 2 x 5mg 4. - 5. 1 x 35mg	1. Antibiotik 2. Antibiotic 3. Udem jantung 4. Meredakan asma ringan 5. antibiotik	1. Oral 2. IV 3. Oral 4. Inhalasi 5. IV	1. - 2. Hipersensitiv amoksilin,p enisilin 3. - 4. - 5. hipersensitiv gentamisin dan aminoglikosida	.

P55	L	11 TH BB :	Obs. Vomiting + dehidrasi ringan – sedang	1. Ranitidin 2. Domperidone 3. Paracetamol syr 4. Paracetamol inf	1. 3 x 25mg 2. 3 x 1,5 cth 3. 3 x 1 cth 4. 1 X 250mg	1. Tukak lambung dan duodenum 2. Dispesia,mual muntah 3. Analgesic 4. analgesik	1. IV 2. IV 3. Oral 4. IV		
P56	L	1,5 TH BB : 10 KG	OF hari ke 3 + obs. Vomiting + ISPA	1. Amoxan drop 2. Sanpiciln 3. Pamol inj 4. Lacto b	1. 1 X 165 g 2. 3 x 350mg 3. 1 X 100mg 4. 2 x 1 sch	1. Antibiotic 2. Antibiotic 3. Analgesic 4. Probiotik	1. Oral 2. IV 3. IV 4. Oral	1. – 2. Hipersensitiv iv amoksilin,p enisilin 3. – 4. -	
P57	L	2 BLN BB : 4,9 KG	Kejang demam kompleks	1. Paracetamol inf 2. Ceftriaxone 3. Sibital 4. Piracetam	1. 3 x 50mg 2. 1 x 400mg 3. 2 x 16,5 mg 4. 2 x 50mg	1. Analgesic 2. Antibiotic 3. – 4. Gejala involusi	1. IV 2. IV 3. IV 4. IV	1. – 2. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbiliru bin 3. – 4. -	
P58	L	4 TH BB : 16,5 KG	Asma attack	1. Combivent inh 2. Methylprednison	1. 2 X 1 2. 2 x 10mg	1. Obstruktif pulmonary distase 2. Antiinflamsi	1. Inhalasi 2. IV		- Methylprednison off-label usia untuk px. Usia 16 than keatas. (ISO 2019)
P59	L	10 BLN BB : 10 KG	Diare akut	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. sequest 4. Orezinc 5. Lacto b 6. Ondansetron 7. Paracetamol inf	1. 2 x 500mg 2. 1 x 10mg 3. 3 x 1 4. 1 x 1 cth 5. 2 x 1 sch 6. 2 x 1 mg 7. 1 X 100mg	1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Menurunkan kadar billirubin 4. Terapi untuk diare anak 5. Probiotik 6. Mual muntah 7. Analgesic	1. IV 2. IV 3. Oral 4. Oral 5. Oral 6. IV 7. IV	1. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbiliru bin 2. – 3. – 4. – 5. – 6. hipersensitiv	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019) - Sequest off-label usia .untuk px.diatas 16 tahun tetapi pada

									iv ondansetr on	kasus resep digunakan untuk px. Dibawah 16 tahun. (BPOM,2020)
P60	L	2 TH BB : 18 KG	Kejang demam kompleks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanpicilin 2. Paracetamol inf 3. Sibital 4. Lacto b 5. Sequest 6. Antrain 7. Histapan 8. Cobazim 9. Pamol inj 10. Stesollid supp 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 x 350mg 2. 1 X 200mg 3. 2 x 40mg 4. 2 x 1 sch 5. 3 x 1 6. 1 X 200mg 7. 3 x 1 8. 3 x 1 9. - 10. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Analgesic 3. Epilepsi 4. Probiotik 5. Menurunkan kadar bilirubin 6. Analgesic 7. Anthistamin 8. Penambah darah 9. Analgesic 10. Psikosomatis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. IV 7. Oral 8. Oral 9. IV 10. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hipersensitiv amoksilin, penisilin 2. - 3. - 4. - 5. - 6. hipersensitiv metampiron 7. - 8. - 9. - 10. - 	- Sequest off-label usia .untuk px.diatas 16 tahun tetapi pada kasus resep digunakan untuk px. Dibawah 16 tahun. (BPOM,2020)	
P61	P	8 TH BB : 18 KG	Low intake	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceftriaxone 2. Ondansetron 3. Omeprazole 4. Zamel syr 5. Orezinc 6. Nixaven syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 900 mg 2. 2 x 2 mg 3. 1 x 20mg 4. 1 x 1 cth 5. 1 x 1 cth 6. 2 x 1 cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotik 2. Mual muntah 3. Tukak lambung dan duodenum 4. Vitamin dan mineral 5. Terapi untuk diare anak 6. Antibiotik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitiv ceftriaxone, neonatus hiperbilirubin 2. hipersensitiv ondansetron 3. - 4. - 5. - 6. - 	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)	

P62	L	7 BLN BB : 6,5 KG	Broncus pneumonia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cefotaxim 2. Paracetamol inf 3. Methylprednisolon 4. Ventolin inh 5. Puyer batuk 6. Antrain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 x 225mg 2. 3 x 70mg 3. 2 x 5mg 4. 3 x 2ml 5. 2 x 1 bks 6. 1 X 70mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Analgesic 3. antiinflamsi 4. Meredakan asma ringan 5. Batuk 6. Analgesic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. Inhalasi 5. Oral 6. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. hipersensitiv metampiron 	<ul style="list-style-type: none"> - Methylprednisolon off-label usia untuk px. Usia 16 than keatas. 9 ISO 2019) - Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P63	P	2 TH BB : 10 KG	OF + obs. Vomitus + dehidrasi ringan – sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceftriaxone 2. Ondansetron 3. Omeprazole 4. Orezinc 5. zamel syr 6. Lacto b 7. Paracetamol inf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 500mg 2. 2 x 1mg 3. 1 x 10mg 4. 1 x 1 cth 5. 1 x 1 cth 6. 1 x 1 sch 7. 1 X 100mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Mual muntah 3. Tukak lambung dan duodenum 4. Terapi ntuk diare anak 5. Vitamin dan mineral 6. Probiotik 7. Analgesic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. Oral 7. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. hipersensitiv ondansetron 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 	<ul style="list-style-type: none"> - Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P64	L	10 TH BB : 42,2 KG	GEA + OF hari ke 3 + ISPA + RW. Probable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamel syr 2. Paracetamol inf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 x 1 cth 2. 1 X 450mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vitamin dan mineral 2. Analgesic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oral 2. IV 		
P65	L	2 TH BB : 9,5 KG	GEA + dehidrasi sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceftriaxone 2. Lacto b 3. Orezinc 4. Nixaven syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 500mg 2. 1 x 1 sch 3. 1 x 20mg 4. 2 x 2,5 cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Terapi untk diare anak 4. Antibiotic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. Oral 3. Oral 4. Oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitiv if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. - 4. - 	

P66	L	7 BLN BB : 6,4 KG	GEA + Vomiting + dehidrasi	1. Lacto b 2. Paracetamol inf	1. 1 x 1 sch 2. 1 X 700 mg	1. Probiotik 2. Analgesic	1. Oral 2. IV		
P67	P	1 TH BB : 10 KG	GEA + susp. BP	1. Ceftriaxone 2. Gentamicin 3. Omeprazole 4. Ondansetron 5. Puyer batuk 6. Orezinc 7. Paracetamol inf 8. Ventolin inh	1. 2 x 500mg 2. 1 x 75mg 3. 1 x 10mg 4. 2 x 1mg 5. 3 x 1 6. 4 x 100mg 7. 1 X ½ amp	1. Antibiotic 2. – 3. Tukak lambung dan duodenum 4. Mual muntah 5. Batuk 6. Terapi untk diare anak 7. Analgesic 8. Meredakan asma ringan	1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. Oral 6. Oral 7. IV 8. Inhalasi	1. hipersensitif if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. hipersensitiv iv gentamisin dan aminoglikosida 3. – 4. hipersensitiv iv ondansetron 5. – 6. – 7. – 8. -	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P68	L	2 TH BB : 13 KG	GEA + dehidrasi ringan - sedang	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Paracetamol inf 5. Nixaven syr 6. Orezinc	1. 2 x 750mg 2. 1 x 15mg 3. 2 x 2mg 4. 4 x 150mg 5. 2 x 3,5ml 6. 1 x 1 cth (20mg)	1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Mual muntah 4. Analgesic 5. Antibiotic 6. Terapi untk diare anak	1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. Oral 6. Oral	1. hipersensitif if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. – 3. hipersensitiv iv ondansetron 4. – 5. – 6. -	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)

P69	L	2,5 TH BB : 16 KG	GEA + dehidrasi	1. Lacto b	1. 2 x 1 sch	1. Probiotik	1. Oral		
P70	L	2 BLN BB : 4,2 KG	GEA + dehidrasi	1. Nixaven syr 2. Lacto b 3. Cefotaxim 4. Paracetamol inf	1. 2 x 1 ml 2. 1 x 1 sch 3. 3 x 150mg 4. 1 X 50mg	1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Antibiotic 4. Analgesic	1. Oral 2. Oral 3. IV 4. IV		
P71	P	2 TH BB : 14 KG	GEA	1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Paracetamol inf 5. Nixaven syr 6. Zamel syr	1. 2 x 700mg 2. 1 x 15mg 3. 2 x 2 mg 4. 5 x 150mg 5. 2 x 3ml 6. 1 x 1 cth	1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenm 3. Mual muntah 4. Analgesic 5. Antibiotic 6. Vitain dan mineral	1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. Oral 6. Oral	1. hipersensitif if ceftriaxone ,neonatus hiperbilurubin 2. – 3. hipersensitiv iv ondansetron 4. – 5. – 6. -	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P72	L	1,5 TH BB : 10 KG	Pneumonia	1. Ceftriaxone 2. Gentamicin 3. Puyer batuk 4. Paracetamol inf 5. Ventolin inh	1. 2 x 500mg 2. 1 x 75mg 3. 3 x 1 4. 1 X 100mg 5. 1 X ½ resep	1. Antibiotic 2. – 3. Batuk 4. Analgesic 5. Meredakan asma ringan	1. IV 2. IV 3. Oral 4. IV 5. inhalasi	1. hipersensitif if ceftriaxone ,neonatus hiperbilurubin 2. hipersensitiv iv gentamisin dan aminoglikosida 3. – 4. – 5. -	

P73	L	1,5 TH BB : 9 KG	GEA + dehidrasi ringan - sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Lacto b 5. Sequest 6. Paracetamol inf 7. Nixaven syr 8. Orezinc 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 450mg 2. 1 x 10mg 3. 2 x 1mg 4. 2 x 1 sch 5. 3 x 1 6. 4 x 100mg 7. 2 x 2,5 cth 8. 1 x 1 cth 9. 2 x 1 sch 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenm 3. Mual muntah 4. Probiotik 5. Menurunkan kadar bilirubin 6. Analgesic 7. Antibiotic 8. Terapi untuk diare anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. Oral 6. IV 7. Oral 8. Oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitif ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. hipersensitiv iv ondansetron 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 	<p>- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)</p> <p>- Sequest off-label usia .untuk px.diatas 16 tahun tetapi pada kasus resep digunakan untuk px. Dibawah 16 tahun. (BPOM,2020)</p>
P74	L	1 TH BB :	Obs. Febris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ondansetron 2. Paracetamol inf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 X 1mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mual muntah 2. Analgesic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitiv iv ondansetron 2. - 	<p>- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)</p>
P75	L	4 TH BB : 20 KG	Astma attack	<ol style="list-style-type: none"> 1. Methylprednisolon 2. Omeprazole 3. Lacto b 4. Combivent inh 5. Orezinc 6. Domperidone syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 x 10mg 2. 1 x 10mg 3. 2 x 1 sch 4. 4 x 1 5. 1 x 1 cth 6. 3 x 1 ½ cth 7. 2 x 1 8. 3 x 150mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. antiinflamasi 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Probiotik 4. Obstrktif pulmonary distase 5. Terapi untuk diare anak 6. Dispesia,mual muntah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. Oral 4. inhalasi 5. Oral 6. Oral 	<p>- Methylprednisolon off-label usia untuk px. Usia 16 than keatas. 9 ISO 2019)</p>	

P76	L	3 TH BB : 14 KG	Abdominal pain	1. Lacto b 2. Paracetamol syr	1. 2 x 1 sch 2. 3 x 150mg	1. Probiotik 2. Analgesic	1. Oral 2. IV		
P77	P	7 TH BB : 25 KG	OF hari ke 3	1. Paracetamol inf	1. 1 X 100mg	1. Analgesik	1. IV		
P78	L	3 TH BB : 14 KG	OF hari ke 3 + ISPA	1. Ampicillin 2. Antrain 3. Paracetamol inf 4. Ampicillin syr	1. 3 x 500mg 2. 1 X 140mg 3. 1 X 150mg 4. 3 x 1 cth	1. Antibiotic 2. Analgesic 3. Analgesic 4. Antibiotic	5. IV 6. IV 7. IV 8. Oral	1. Hipersensit iv amoksilin,p enisilin 2. hipersensit iv metampiro n 3. - 4. Hipersensit iv amoksilin,p enisilin	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P79	P	3 TH BB : 11 KG	GEA + dehidrasi	1. Lacto b 2. Pamol inf	1. 2 x 1 sch	2. Probiotik 3. Analgesic	1. Oral 2. IV		
P80	P	6 TH BB : 15 KG	KDK	1. Sanpicillin 2. Sibital	1. 3 x 600mg 2. 2 x 40mg	1. Antibiotic 2. -	1. IV 2. IV	1. Hipersensit iv amoksilin,p enisilin 2. -	
P81	L	5 TH BB : 17 KG	OF febris	1. Paracetamol inf 2. Zamel syr	1. 1 X 200mg 2. 1 x 1 cth	1. Analgesic 2. Vitamin dan mineral	1. IV 2. Oral		
P82	P	2 TH BB : 10 KG	Obs. Vomitus	1. Ondansetron	3 x 1mg	1. mual muntah	1. IV	1. hipersensit iv ondansetr on	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs

kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)

P83	L	1 TH BB : 14 KG	GEA + dehidrasi ringan- sedang	1. lacto b 2. oralit	1. 2 x 1 sch 2. 1 x 1 sch	1. Probiotik 2. Penambah elektrolit	1. Oral 2. Oral		
P84	L	23 HR BB : 3,5 KG	Intake sulit + icteric	1. Ceftriaxone 2. Interlac 3. Nixaven syr 4. Orezinc	1. 2 x 200mg 2. 1 x 5 tetes 3. 2 x 1ml 4. 1 x 2,5 cth 5. 1 x 1 cth	1. Antibiotic 2. - 3. Antibiotic 4. Terapi untuk diare anak	1. IV 2. Oral 3. Oral 4. Oral	1. hipersensitif if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. - 4. -	
P85	P	4 TH BB : 14 KG	DHF	1. Zamel syr	1 x 1 cth	1. Vitamn dan mineral	1. Oral		
P86	P	7 TH BB : 18 KG	Obs. Vomiting + dehidrasi sedang	1. Domperidone syr 2. Paracetamol inf 3. Zamel syr	1. 3 x 1 cth 2. 1 X 100mg 3. 1 x 1 cth	1. Dispesia,mual muntah 2. Analgesic 3. Vitamin dan mineral	1. Oral 2. IV 3. Oral		
P87	L	2,5 TH BB : 9 KG	Obs. Vomiting + dehidrasi	1. Domperidone syr 2. Paracetamol inf 3. Zamel syr	1. 3 x 1 cth 2. 1 X 100mg 3. 1 x 1 cth	1. Dispesia,mual muntah 2. Analgesic 3. Vitamin dan mineral	1. Oral 2. IV 3. Oral		
P88	L	1 TH BB : 6,5 KG	Diare akut + dehidrasi sedang – berat	1. Cefotaxim 2. Paraetamol inf 3. Lacto b 4. Orezinc	1. 3 x 250mg 2. 1 X 70mg 3. 2 x 1 sch 4. 1 x 1 cth	1. Antibiotic 2. Analgesic 3. Probiotik 4. Terapi untuk diare anak	1. IV 2. IV 3. Oral 4. Oral		

P89	P	1 TH BB : 8,7 KG	OF febris + susp.viral infection	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Gentamicin 5. Lacto b 6. Orezinc 7. Paracetamol inf 8. Nixaven syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 400mg 2. 1 x 10mg 3. 2 x 1mg 4. 1 x 65mg 5. 2 x 1 sch 6. 1 x 5 ml 7. 4 x 100mg 8. 2 x ½ cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Mual muntah 4. - 5. Probiotik 6. Terapi untuk diare anak 7. Analgesic 8. Antibiotic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. Oral 6. Oral 7. IV 8. oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitif if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. hipersensitiv iv ondansetron 4. hipersensitiv gentamisin dan aminoglikosida 5. - 6. - 7. - 8. - 	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)
P90	L	4 TH BB : 13 KG	DHF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cefotaxim 2. Pamol inf 3. Zamel syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. 1 X 150mg 3. 1 x 1 cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Analgesic 3. Vitamin dan mineral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. Oral 		
P91	P (alergi susu sapi)	2 TH BB : 10 KG	GEA + dehidrasi ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lacto b 2. Paracetamol inf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 1 sch 2. 1 X 100ml 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Probiotik 2. Analgesic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oral 2. IV 		
P92	L	1 TH BB : 9 KG	GEA + dehidrasi ringan - sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceftriaxone 2. Omeprazole 3. Ondansetron 4. Paracetamol inf 5. Nixaven syr 6. Lacto b 7. sequest 8. Cobazim 9. Orezinc 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 x 450mg 2. 1 x 10mg 3. 2 x 1 mg 4. 1 X 100mg 5. 2 x ½ cth 6. 2 x 1 sch 7. 3 x ¼ cth 8. 3 x ¼ cth 9. 1 x 1 cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Tukak lambung dan duodenum 3. Mual muntah 4. Analgesic 5. Antibiotic 6. Probiotik 7. Menurunkan kadar bilirubin 8. Penambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. IV 4. IV 5. Oral 6. Oral 7. Oral 8. Oral 9. Oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hipersensitif if ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin 2. - 3. hipersensitiv iv ondansetron 	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019) Sequest off-label usia

						darah 9. Terapi untuk diare anak		on 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. -	.untuk px.diatas 16 tahun tetapi pada kasus resep digunakan untuk px. Dibawah 16 tahun. (BPOM,2020)
P93	P (alergi seafood)	4 TH BB : 25 KG	GEA + dehidrasi ringan - sedang	1. Cefotaxim 2. Lacto b 3. Paracetamol inf 4. Domperidone syr	1. 3 x 800mg 2. 2 x 1 sch 3. 1 X 250mg 4. 3 x ½ cth	1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Analgesic 4. Dispesia,mual muntah	1. IV 2. Oral 3. IV 4. Oral		
P94	P	2 TH BB : 13 KG	OF hari ke 3	1. Paracetamol inf 2. Zamel syr	1. 1 X 150mg 2. 1 x 1 cth	1. Analgesic 2. Vitamin dan mineral	1. IV 2. Oral		
P95	P	2,5 TH BB : 13 KG	OF hari ke 2	1. Paracetamol inf 2. Zamel syr 3. Antrain	1. 1 X 150mg 2. 1 x 1 cth 3. -	1. Analgesic 2. Vitamin dan mineral 3. Analgesic	1. IV 2. Oral 3. IV	1. - 2. - 3. hipersensitiv metampiron	- Antrain off-label usia untuk px. Usia 16 tahun keatas.(ISO 2019)
P96	P	5 TH BB : 16 KG	DHF	1. Paracetamol inf 2. Zamel syr	1. 1 X 160mg 2. 1 x 1 cth	1. Analgesic 2. Vitamin dan mineral	1. IV 2. Oral		
P97	L	3 TH BB : 15 KG	Obs.vomiting + dehidrasi ringan	1. Ceftriaxone 2. Ondansetron 3. Omeprazole 4. orezinc 5. Paracetamol inf	1. 2 x 600mg 2. 2 x 2mg 3. 1 x 2mg 4. 1 x 1 ml 5. 1 X 150mg	1. Antibiotik 2. Mencegah mual muntah pcs kemoterapi 3. Tukak donenum,tukak lambung 4. Terapi untk diare anak 5. Analgesik	1. IV 2. IV 3. IV 4. Oral 5. IV	1. hipersensitif ceftriaxone,neonatus hiperbilirubin 2. hipersensitiv ondansetron	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)

								tron 3. – 4. 5.	
								ganggu a n hati	
P98	P	9 BLN BB : 7 KG	Hiperpireksia	<ol style="list-style-type: none"> Orezinc Lacto B Kandistatin Nixaver syr Ceftriaxone Sagestam Omeprazole Ondansetron Paracetamol inf Dexamethason 	<ol style="list-style-type: none"> 1 x1 sch 2 x 1 sch 1 x 1 2 x 1,5ml 2 x 300mg 1 x 50mg 1 x 10mg 2 x 1mg 4 x 100mg 3 x 2mg 	<ol style="list-style-type: none"> Terapi untk diare anak Probiotik Antijamur Antibiotic Antibiotic Antibiotic Tukak lambung dan duodenum Mual muntah Analgesic Asma bronkial 	<ol style="list-style-type: none"> Oral Oral – Oral IV IV IV IV IV IV 	<ol style="list-style-type: none"> – – Hipersensitiv nystatin – hipersensitif ceftriaxone ,neonatus hiperbilirubin hipersensitiv gentamisin dan aminoglikosida – hipersensitiv ondansetron – Hipersensitiv dexamethasone 	- Ondansetron off- label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)



P99	P	7 TH BB : 25 KG	DBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paracetamol inf 2. Antrain 3. Domperidone syr 4. Ranivel syr 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 X 200mg 2. 1 X 200mg 3. 3 x 1 cth 4. 3 x 1 cth 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analgesik 2. Analgesik 3. Mual muntah akut 4. Tukak lambung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IV 2. IV 3. Oral 4. Oral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. gangguan hati 2. hipersensitiv metampiron 	.
P100	L	1 TH BB : 10 KG	GEA + Vomiting + Dehidrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nixaver syr 2. Lacto B 3. Ceftriaxone 4. Ondansetron 5. Omeprazole 	<ol style="list-style-type: none"> 6. 2 x 2,5 cth 7. 2 x 1 h 8. 2 x 500mg 9. 2 x 1mg 10. 1 x 10mg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotic 2. Probiotik 3. Antibiotic 4. Mual muntah dan duodenum 5. Tukak lambung dan duodenum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oral 2. Oral 3. IV 4. IV 5. IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. - 2. - 3. hipersensitif ceftriaxone, neonatus hiperbilirubin 4. hipersensitiv ondansetron 5. - 	- Ondansetron off-label indikasi. Untuk px. Mual muntah pcs kemoterapi tetapi digunakan untuk px. Mual mutah obs. Vomiting (ISO 2019)



