

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PMB Santi yang berlokasi di desa Jabung Kabupaten Malang. Pengelola PMB yaitu Bidan Santi. PMB ini memiliki 4 ruangan yaitu dua ruangan pemeriksaan, satu ruangan bersalin yang terdiri dari 2 tempat tidur, dan satu ruangan nifas yang terdiri dari 3 tempat tidur. Pelayanan di PMB ini meliputi pelayanan antenatal, intranatal, postnatal, pelayanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 3 Maret sampai dengan 21 April 2020 di PMB Bidan Santi Rahayu Jabung Kabupaten Malang diperoleh data sebagai berikut:

4.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur yang dibedakan menjadi dua kategori yang dapat dilihat pada table 4.1

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Respondensi berdasarkan Umur

NO	UMUR	KELOMPOK KONTROL		KELOMPOK INTERVENSI		total
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1.	20-30 tahun	1	10%	4	40%	5
2.	>30- ≤ 35 tahun	9	90%	6	60%	15
	Total	10	100%	10	100%	20

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 4.1 Menunjukkan bahwa dari 10 responden kelompok kontrol hampir seluruhnya responden berumur > 30 - ≤ 35 tahun sejumlah 9 orang (90%) dan sebagian kecil ada 1 orang (10%) berusia 20-30

tahun. Dan didapatkan pada kelompok intervensi sebagian besar responden berumur $> 30 - \leq 35$ tahun sejumlah 6 orang (60%) dan hampir setengahnya berumur 20-30 tahun sejumlah 4 orang (40%).

4.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Karakteristik respondensi berdasarkan pendidikan yang dibedakan menjadi tiga kategori yang dapat dilihat pada table 4.2

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Respondensi berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	KELOMPOK KONTROL		KELOMPOK INTERVENSI		total Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SLTA	5	50%	4	40%	9
2.	Diploma	4	40%	5	50%	9
3.	Sarjana	1	10%	1	10%	2
	Jumlah	10	100%	10	100%	20

Sumber : Data Primer 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 10 responden kelompok kontrol setengahnya berpendidikan SLTA sejumlah 5 orang (50%) dan sebagian kecil responden berpendidikan Sarjana sebanyak 1 orang (10%), dan didapatkan pada kelompok intervensi dari 10 responden didapatkan setengahnya berpendidikan SLTA sebanyak 5 orang (50%) dan sebagian kecil berpendidikan Sarjana sejumlah 1 orang (10%).

4.2.3 Karakteristik Respondensi berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik respondensi berdasarkan pekerjaan yang dibedakan menjadi tiga kategori yang dapat dilihat pada table 4.3

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Respondensi berdasarkan Pekerjaan

NO	Pekerjaan	KELOMPOK KONTROL		KELOMPOK INTERVENSI		total Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
		1.	Ibu Rumah Tangga	6	60%	
2.	Swasta	2	20%	5	50%	7
3.	Wiraswasta	2	20%		10%	2
	Jumlah	10	100%	10	100%	20

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 10 respondensi dari kelompok kontrol sebagian besar sebagai ibu rumah tangga sejumlah 6 orang (60%) dan sebagian kecil bekerja sebagai wiraswasta/swasta sebanyak 2 orang (20%). Dan didapatkan pada 10 responden kelompok intervensi setengahnya bekerja sebagai ibu rumah tangga 5 orang (50%), bekerja swasta 5 orang (50%).

4.2.4 Karakteristik Respondensi berdasarkan Paritas

Karakteristik respondensi berdasarkan paritas yang dibedakan menjadi tiga kategori yang dapat dilihat pada table 4.4

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Respondensi berdasarkan Paritas

NO	Paritas	KELOMPOK KONTROL		KELOMPOK INTERVENSI		total Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
		1.	2	4	40%	
2.	3	4	40%	3	30%	7
3.	4	2	20%			2
	Jumlah	10	100%	10	100%	

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 10 respondensi pada kelompok kontrol hampir setengahnya paritas ke dua sejumlah 4 orang (40%), paritas ketiga sejumlah 4 orang (40%) dan sebagian kecil paritas ke empat sejumlah 2 orang (20%). Pada kelompok Intervensi terdapat 10

respondensi sebagian besar paritas ke dua sejumlah 7 orang (70%) dan hampir setengahnya paritas ke tiga sejumlah 3 orang (30%).

4.3 Data Khusus

Pada bagian ini menyajikan data khusus hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh *pelvic rocking exercise* terhadap lama waktu persalinan kala II pada multipara di PMB bidan Santi kabupaten malang yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Lama waktu Persalinan Kala II pada Multipara dengan *Pelvic Rocking Exercise*

Distribusi frekuensi respondensi berdasarkan lama waktu persalinan kala II yang tidak dilakukan *pelvic rocking exercise* dapat dilihat pada table 4.6

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Respondensi berdasarkan lama waktu persalinan kala II yang tidak dilakukan *pelvic rocking exercise*

Lama Persalinan Kala II	Frekuensi	Presentase (%)
Normal	1	10
Cepat	1	10
Lambat	8	80
Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa dari 10 orang responden yang tidak dilakukan *pelvic rocking exercise* hampir seluruhnya pada persalinan kala II berjalan lambat sebanyak 8 orang (80%) sedangkan sebagian kecil terdapat 1 orang (10%) yang tidak dilakukan *pelvic rocking exercise* lama persalinan pada kala II Multipara berjalan cepat dan normal.

Distribusi frekuensi respondensi berdasarkan lama waktu persalinan kala II yang dilakukan *pelvic rocking exercise* dapat dilihat pada table 4.7

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Respondensi berdasarkan lama waktu persalinan kala II yang dilakukan *pelvic rocking exercise*

Lama Persalinan Kala II	Frekuensi	Presentase (%)
Normal	1	10
Cepat	8	80
Lambat	1	10
Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa ada 10 responden ibu bersalin multipara yang dilakukan *pelvic rocking exercise* hampir seluruhnya mengalami percepatan kala II sebanyak 8 orang (80%) sedangkan sebagian kecil yang berjalan lambat dan normal pada persalinan Kala II sebanyak 1 orang (10%).

4.4 Analisa Pengaruh *Pelvic Rocking Exercise* terhadap lama waktu persalinan Kala II pada Multipara di PMB Bidan Santi Kabupaten Malang

Tabel 4.8 lama waktu persalinan Kala II pada Multipara di PMB Bidan Santi Kabupaten Malang

N O	Responden	Normal		Cepat		Lambat		total	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	F	%
1.	Intervensi	1	10%	8	80%	1	10%	10	100%
2.	Kontrol	1	10%	1	10%	8	80%	10	100%
.	Jumlah	2	10%	9	45%	9	45%	20	100%

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 di dapatkan hasil dari 20 responden yang dibagi menjadi 10 responden kelompok intervensi yang dilakukan *pelvic rocking exercise* hampir seluruhnya mengalami percepatan kala II sebanyak 8 orang (80%). Sedangkan 10 responden sebagai kontrol yang tidak dilakukan *pelvic*

rocking exercise hampir seluruhnya mengalami lama kala II lebih lambat sebanyak 8 orang (100%).

Tabel 4.9 Pengaruh *Pelvic Rocking Exercise* terhadap lama waktu persalinan kala II pada multipara dengan Uji *Mann Whitney*

	Responden	N	Mean Rank	Sum Of Rank	Asymp. Sig. (2-Tailed)
Lama Kala II	Perlakuan	10	5.80	58.00	.000
	Kontrol	10	15.20	152.00	
	Total	20			

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui responden yang melakukan *pelvic rocking exercise* dengan jumlah 10 orang dan pada 10 responden yang tidak melakukan *pelvic rocking exercise* dengan menggunakan analisis *Mann Whitney* menunjukkan nilai $p\text{-value} = 0.000$ karena probabilitas $p\text{-value} < 0,05$ yang berarti H_1 diterima, yang artinya ada pengaruh *pelvic rocking exercise* terhadap lama waktu persalinan kala II pada ibu bersalin Multipara di PMB Bidan Santi Rahayu kabupaten Malang 2020.